

## Valutazioni nutrizionali e cliniche

**CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA DIARREA DELL'INTESTINO TENUE E DELL'INTESTINO CRASSO**

Elemento	Intestino tenue*	Intestino crasso*
<b>Feci</b>		
Volume	Da normale a notevolmente aumentato	Da normale a diminuito
Consistenza	Da molto acquose a semi-formate (punteggio fecale tipico 6 o 7)	Semi-formate, gelatinose (punteggio fecale tipico 4 o 5)
Sangue	Se presente, nero o scuro, catramoso	Se presente, rosso brillante, fresco
Muco	Non comune	Frequente
Colore	Variabile	Normale
Grasso	Possibile presenza	Assente
<b>Defecazione</b>		
Tenesmo (sforzo)	Assente	Presente
Urgenza	Da normale a leggermente aumentata	Notevolmente aumentata
Frequenza	Da normale ad aumentata	Notevolmente aumentata
<b>Segnali correlati</b>		
Vomito	Possibile presenza	Non comune
Flatulenza	Possibile presenza	Non comune
Appetito	Normale, diminuito o aumentato	Di solito normale
Perdita di peso	Comune	Non comune
* In alcuni casi sono interessati sia l'intestino tenue sia l'intestino crasso e i segni clinici possono variare.		

**Bibliografia**

Tams, T. R. (1996). Gastrointestinal symptoms. In T. R. Tams (Ed.), *Handbook of small animal gastroenterology* (pp. 44-45). Saunders.

Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman, & E. Côté (Eds.), *Textbook of veterinary internal medicine: Diseases of the dog and the cat* (8th ed., p. 3669). Elsevier.