

Évaluations nutritionnelles et cliniques

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DE LA DIARRHÉE DE L'INTESTIN GRÊLE ET DU CÔLON

Facteur	Intestin grêle*	Côlon*
Selles		
Volume	Normal à en forte hausse	Normal à en baisse
Consistance	Très aqueuse à semi-formée (score fécal de type 6 ou 7)	Semi-formée, gélatineuse (score fécal de type 4 ou 5)
Sang	Le cas échéant, foncé ou noir, aspect goudronneux	Le cas échéant, rouge vif, aspect frais
Mucus	Peu fréquent	Fréquent
Couleur	Variable	Normale
Graisse	Présence possible	Absente
Défécation		
Ténésme (effort)	Absence	Présence
Urgence	Normale à légèrement en hausse	Nettement en hausse
Fréquence	Normale à en hausse	Nettement en hausse
Signes associés		
Vomissements	Présence possible	Peu fréquents
Flatulences	Présence possible	Rare
Appétit	Normal, en baisse ou en hausse	Généralement normal
Perte de poids	Fréquente	Rare
*Dans certains cas, l'intestin grêle et le côlon sont tous les deux touchés, et les signes cliniques varient.		

Références

Tams, T. R. (1996). Gastrointestinal symptoms. In T. R. Tams (Ed.), *Handbook of small animal gastroenterology* (pp. 44-45). Saunders.

Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman, & E. Côté (Eds.), *Textbook of veterinary internal medicine: Diseases of the dog and the cat* (8th ed., p. 3669). Elsevier.