



BEURTEILUNGSWERKZEUG

FÜR KOGNITIVES DYSFUNKTIONSSYNDROM

Das kognitive Dysfunktionssyndrom (CDS) ist eine irreversible Degeneration des Gehirns ähnlich der Alzheimer-Krankheit beim Menschen, die durch eine fortschreitende kognitive Beeinträchtigung gekennzeichnet ist, die über die mit dem Alterungsprozess zu erwartende Beeinträchtigung hinausgeht. CDS beginnt langsam, kann schwierig zu behandeln sein und betrifft schätzungsweise 14 % aller Hunde ab 8 Jahren.

Was ist DISHAA?

Damit bei einem Hund CDS diagnostiziert werden kann, müssen die Besitzer bestimmte Verhaltensweisen ihres Hundes beobachten. Das DISHAA-Tool hilft Besitzern, diese Verhaltensweisen zu erkennen, und ermöglicht es Tierärzten und Besitzern, gemeinsam die geistige Leistungsfähigkeit des Hundes zu beurteilen.

D

ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT

- Bleibt hängen, hat Schwierigkeiten, um Gegenstände herumzugehen, läuft Richtung Türinnenseite
- Starrt ausdruckslos auf Wände, den Boden oder ins Leere
- Erkennt keine vertrauten Personen/bekanntes Haustiere
- Verläuft sich im Haus oder auf dem Grundstück
- Geringere Reaktion auf visuelle oder auditive Reize

I

SOZIALE INTERAKTIONEN

- Reizbarer/ängstlicher/aggressiver gegenüber Besuchern, der Familie oder anderen Tieren
- Interesse an Annäherung, Begrüßung oder Zuneigung/Streicheln nimmt ab

S

SCHLAF-/WACH-RHYTHMUS

- Auf und ab schreitend/unruhig/schläft weniger/wacht nachts auf
- Lautäußerungen in der Nacht

H

INKONTINENZ, LERNFÄHIGKEIT UND GEDÄCHTNIS

- Weniger in der Lage, neue Aufgaben zu lernen oder auf bereits gelernte Befehle/Namen/Aufgaben zu reagieren
- Verschmutzung der Innenräume durch Urin oder Kot/verminderte Signalisierung zum Rausgehen
- Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit des Hundes zu erlangen/erhöhte Ablenkung/verringerte Konzentration

A

AKTIVITÄT

- Weniger Interesse etwas Neues zu entdecken und am Spiel mit Spielzeug, Familienmitgliedern oder anderen Haustieren
- Erhöhte Aktivität, einschließlich ziellosem Herumlaufen oder Umherwandern
- Sich wiederholende Verhaltensweisen (z. B. im Kreis laufen/Kauen/Lecken/in den Himmel schauen)

A

ANGST

- Mehr Angst bei Trennung von den Besitzern
- Reagiert stärker/ängstlicher auf visuelle oder auditive Reize
- Erhöhte Angst vor Orten/Räumen (z. B. vor neuen Umgebungen/dem Aufenthalt im Freien)



**BEURTEILUNGSWERKZEUG
FÜR KOGNITIVES DYSFUNKTIONSSYNDROM**

Das kognitive Dysfunktionssyndrom (CDS) ist eine irreversible Degeneration des Gehirns ähnlich der Alzheimer-Krankheit beim Menschen, die durch eine fortschreitende kognitive Beeinträchtigung gekennzeichnet ist, die über die mit dem Alterungsprozess zu erwartende Beeinträchtigung hinausgeht. CDS beginnt langsam, kann schwierig zu behandeln sein und betrifft schätzungsweise 14 % aller Hunde ab 8 Jahren.

- D** ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
- I** SOZIALE INTERAKTIONEN
- S** SCHLAF-/WACH-RHYTHMUS
- H** INKONTINENZ,
LERNFÄHIGKEIT
UND GEDÄCHTNIS
- A** AKTIVITÄT
- A** ANGST

Was ist DISHAA?

DISHAA ist ein Tool, das Ihnen und Ihrem Tierarzt hilft, die geistige Leistungsfähigkeit Ihres Hundes einzuschätzen, und mit dem Ihr Tierarzt möglicherweise das kognitive Dysfunktionssyndrom (CDS) diagnostizieren kann.

Datum: _____

Name des Besitzers: _____ Name des Haustiers: _____

Alter: _____ Geschlecht: Männlich Weiblich Kastriert/Sterilisiert: Nein Ja

Rasse: _____ Gewicht: _____

BCS (Body Condition Score 1–9): _____ Aktuelle Ernährung: _____

Medikamente und Dosierung: _____

Bitte füllen Sie diese kognitive Beurteilung für ältere Hunde aus. Wenn Sie Veränderungen in verschiedenen Verhaltenskategorien festgestellt haben, sollten Sie umgehend mit Ihrem Tierarzt über die Gesundheit des alternden Gehirns Ihres Haustiers sprechen.

ANZEICHEN IM VERHALTEN

Beurteilen Sie Anzeichen, die ab dem 8. Lebensjahr aufgetreten oder stärker geworden sind.

Bewertung: 0 = nicht zutreffend, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = schwerwiegend

Punktzahl

ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT	
Bleibt hängen, hat Schwierigkeiten, um Gegenstände herumzugehen, läuft Richtung Türinnenseite	
Starrt ausdruckslos auf Wände, den Boden oder ins Leere	
Erkennt keine vertrauten Personen/bekanntes Haustiere	
Verläuft sich im Haus oder auf dem Grundstück	
Geringere Reaktion auf visuelle oder auditive Reize	

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite mit der Beurteilung fort.



BEURTEILUNGSWERKZEUG

FÜR KOGNITIVES DYSFUNKTIONSSYNDROM

FORTSETZUNG

ANZEICHEN IM VERHALTEN

Beurteilen Sie Anzeichen, die ab dem 8. Lebensjahr aufgetreten oder stärker geworden sind.

Bewertung: 0 = nicht zutreffend, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = schwerwiegend

Punktzahl

SOZIALE INTERAKTIONEN

Reizbarer/ängstlicher/aggressiver gegenüber Besuchern, der Familie oder anderen Tieren

Interesse an Annäherung, Begrüßung oder Zuneigung/Streicheln nimmt ab

SCHLAF-/WACH-RHYTHMUS

Auf und ab schreitend/unruhig/schläft weniger/wacht nachts auf

Lautäußerungen in der Nacht

INKONTINENZ, LERNFÄHIGKEIT UND GEDÄCHTNIS

Weniger in der Lage, neue Aufgaben zu lernen oder auf bereits gelernte Befehle/Namen/Aufgaben zu reagieren

Verschmutzung der Innenräume durch Urin ___ oder Kot ___/verminderte Signalisierung zum Rausgehen

Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit des Hundes zu erlangen/erhöhte Ablenkung/verringerte Konzentration

AKTIVITÄT

Weniger Interesse etwas Neues zu entdecken und am Spiel mit Spielzeug, Familienmitgliedern oder anderen Haustieren

Erhöhte Aktivität, einschließlich ziellosem Herumlaufen oder Umherwandern

Sich wiederholende Verhaltensweisen, z. B. im Kreis laufen ___/Kauen ___/Lecken ___/in den Himmel schauen ___

ANGST

Mehr Angst bei Trennung von den Besitzern

Reagiert stärker/ängstlicher auf visuelle oder auditive Reize

Erhöhte Angst vor Orten/Räumen (z. B. vor neuen Umgebungen/dem Aufenthalt im Freien)

GESAMTERGEBNIS (DIE PUNKTE VON DER VORDERSEITE DES BLATTES MÜSSEN ÜBERNOMMEN WERDEN)

Sobald dieses Formular ausgefüllt ist, wird Ihr Tierarzt die Ursache für diese Anzeichen durch eine körperliche Untersuchung und empfohlene diagnostische Tests feststellen. Aber auch wenn Ihr älteres Haustier unter mehreren altersbedingten Gesundheitsproblemen leidet, kann CDS in gewissem Maße auftreten.

Eine Punktzahl von 4–15 entspricht einem leichten, 16–33 einem mittleren und > 33 einem schwerwiegenden CDS.